

## Összesítő jelentés a csecsemőtáplálásról

Az egészségügyi intézmény neve: \_\_\_\_\_

Az adatgyűjtés időszaka: \_\_\_\_\_-től \_\_\_\_\_-ig

A jelentés készítője: \_\_\_\_\_

Dátum: \_\_\_\_\_

Írja be az adott megfigyelési időszak adatait a „Csecsemőtáplálási adatlapokról”, és számolja ki az alábbi indikátorok százalékos arányait.

Adat típusa	Szám	Százalék
Az adatgyűjtés időszakában született újszülöttek teljes száma:		
Speciális újszülött ellátó egységbe áthelyezett újszülöttek száma:		
Összes mínusz speciális ellátásba áthelyezett újszülöttek száma:		100%
A szülés módja		
Hüvelyi		
Császármetszés általános érzéstelenítés nélkül		
Császármetszés általános érzéstelenítésben		
Bőr-bőr kontaktus a szülést (vagy a reagálási képesség helyreállítását) követő 5 percen belül legalább 1 órán át, és a szoptatáshoz való segítség felajánlása		
Táplálás típusa		
Kizárólagos szoptatás vagy kizárólagosan a saját anyja lefejt tejjel történő táplálás, illetve pótlás		
Szoptatás donor női tejjel történő kiegészítéssel dokumentált orvosi indikáció vagy az anya felvilágosítás után hozott döntése alapján		
Szoptatás donor női tejjel történő kiegészítéssel dokumentált orvosi indikáció vagy az anya felvilágosítás után hozott döntése <u>nélkül</u>		
Szoptatás tápszer-kiegészítéssel dokumentált orvosi indikáció vagy az anya felvilágosítás után hozott döntése alapján		
Szoptatás tápszer-kiegészítéssel dokumentált orvosi indikáció vagy az anya felvilágosítás után hozott döntése <u>nélkül</u>		
Mesterséges táplálás		
Összesen (az összegnek 100%-nak kell lennie)		100%
Kiegészítést kapott, de a hazabocsátás előtti utolsó 24 órában kizárólag szoptott		
Táplálás módja (az összegnek 100%-nak kell lennie)		
Emlő		
Cumisüveg		
Pohár		
Egyéb (kérem, sorolja fel)		
Bimbóvédővel szoptott		

Újszülöttek elhelyezése (az összegnek 100%-nak kell lennie)		
Rooming-in/közös ágy		
RI + újszülöttosztály/megfigyelő helyiség dokumentált orvosi indikáció alapján vagy az anya felvilágosítás utáni kérésére		
RI + újszülöttosztály/megfigyelő helyiség dokumentált orvosi indikáció vagy az anya felvilágosítás utáni kérése <u>nélkül</u>		
Egyéb		
A mellrehelyezéssel, mellretapadással és/vagy csecsemőtáplálással kapcsolatos problémák típusai (kérem, összegezze):		
A bimbóvédő alkalmazásának leggyakoribb okai (kérem, összegezze):		